



Responsabilités du médecin référent ou de l'Infirmière praticienne spécialisée

- ✓ Avoir évalué le patient préalablement à la demande;
- ✓ Avoir dûment complété le formulaire de référence;
- ✓ Être joignable en tout temps durant les heures ouvrables de l'Accueil clinique soit du lundi au vendredi entre 8h et 16h (ou un collègue de travail);
- ✓ Respecter les critères d'inclusion et d'exclusion tels que précisés ci-dessous;
- ✓ Être en mesure d'assurer le suivi de l'usager une fois l'épisode de soins à l'Accueil clinique complété;



Critères d'inclusion au programme d'Accueil clinique de l'ICM

- ✓ Présenter une douleur thoracique de novo ou d'apparition récente suggestive d'angine;
- ✓ Nécessiter une prise en charge dans un délai de 24-72h;
- ✓ Être âgé de 18 ans et plus;
- ✓ Clientèle ambulatoire avec une condition physique qui permet les déplacements (ou l'aide d'une personne);
- ✓ Problématique de santé mentale stable ou un trouble cognitif compensé par un réseau de soutien;
- ✓ Présenter une condition clinique stable;
 - FC < 120/min ,
 - FR < 30/min
 - TAS > 90mmHg ou < 180 mmHg
 - TAD < 120mmHg
 - SaO₂ > 90 %,
 - T° > 35 °C ou < 40 °C
 - Aucune altération de l'état de conscience
- ✓ Être en mesure de fournir un numéro de téléphone où l'utilisateur pourra être rejoint rapidement;



Critères d'exclusion au programme d'Accueil clinique

- Suspicion d'angine instable (DRS active, DRS non soulagée par la prise de NTG x 3 doses , DRS d'une durée ≥ 20 minutes); → **RÉFÉRER LE PATIENT À L'URGENCE**
- Présenter un ou plusieurs signe(s) d'instabilité hémodynamique ; → **RÉFÉRER LE PT À L'URGENCE**
 - FC ≥ 120 /min ,
 - TAS ≤ 90 mmHg ou ≥ 180 mmHg
 - TAD ≥ 120 mmHg
 - Altération de l'état de conscience
 - FR ≥ 30 /min
 - SaO₂ < 90 %,
 - T⁰ ≤ 35 °C ou ≥ 40 °C
 - Saignement actif
- Patient(e) déjà connu(e) ET/OU suivi(e) par un cardiologue;
- Maladie valvulaire aortique connue;
- Maladie de l'aorte connue;
- Présenter des signes d'insuffisance cardiaque décompensée;
- Dyspnée de novo ou exacerbée;
- Palpitations de novo;
- Syncope;
- Être âgé de moins de 18 ans;
- Nécessiter l'aide de deux personnes ou d'un levier pour se mobiliser;
- Problématique de santé mentale instable ou trouble cognitif non compensé par un réseau de soutien;